

# ZEN-CHRY'S

Insecticida Orgánico

PIRETRINA



## DESCRIPCIÓN:

Insecticida y acaricida orgánico hecho a base de extractos y piretrinas naturales, actúa por contacto e ingestión.

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

### Ingrediente Activo:

Piretrinas naturales .....**2.5%**  
 Acondicionadores y Diluyentes .....**97.5%**

## DÓSIS Y MODO DE APLICACIÓN:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS / HA	RECOMENDACIÓN
Hortalizas en general	Mosca blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> ), pulgones ( <i>Myzus persicae</i> ), pulgón saltador ( <i>Bactericera cockerelli</i> ), Trips ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	1-2 L/Ha	Realizar una aplicación cada 10-15 días como repelente. Realizar 3 aplicaciones a intervalos de 5 días para controlar infestaciones.
Frutales	Pulgones ( <i>Melanaphis sacchari</i> ), mosca de la fruta ( <i>Ceratitis capitata</i> ), mosca mexicana de la fruta ( <i>Anastrepha ludens</i> )	1-2 L/Ha	Realizar una aplicación cada 10-15 días como repelente. Realizar 3 aplicaciones a intervalos de 5 días para controlar infestaciones.
Frutillas	Mosca blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> ), araña roja ( <i>Tetranychus urticae</i> ), Trips ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	1-2 L/Ha	Realizar una aplicación cada 10-15 días como repelente. Realizar 3 aplicaciones a intervalos de 5 días para controlar infestaciones.

( ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la aplicación y cosecha. **SL**: Sin límite

## BENEFICIOS

\* ACTÚA POR CONTACTO.

\* NO GENERA RESISTENCIA.

\* REMUEVE RESIDUOS DE PESTICIDAS QUÍMICOS DE LAS HOJAS Y FRUTOS.



Periodo de reentrada al área tratada: 12 horas.



### MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Agite vigorosamente, abra el envase, retire el sello de seguridad, mida la cantidad de **ZEN-CHRY'S** con la ayuda de una probeta o algún utensilio específico para este uso. Mezcle en un recipiente la cantidad de producto a utilizar con agua, agite, posterior agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión. Su aplicación es vía foliar con mochila de aspersión, fumigadora motorizada y/o nebulizadora.



### TOXICOLOGÍA:

Categoría tóxica: **5. Precaución/Verde.**



**CONTRAINDICACIONES:** No aplicar en horas de calor intenso, cuando exista una probabilidad alta de lluvia o cuando la velocidad del viento sea alta.

**FITOTOXICIDAD:** No es Fitotóxico a las dosis y cultivo aquí recomendado y usado bajo las recomendaciones de esta etiqueta.

**INCOMPATIBILIDAD:** Compatible con bactericidas orgánicos, reguladores de crecimiento y acondicionadores. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba antes de hacer la mezcla final.

**CADUCIDAD:** Dos años a partir de la fecha de fabricación.