



# ZEN-CU

Bactericida

GLUCONATO DE COBRE 26%

## DESCRIPCIÓN:

Bactericida agrícola de contacto, elaborado con gluconato de cobre. Preventivo y curativo contra enfermedades ocasionadas por bacterias fitopatógenas. Actúa contra las bacterias rompiendo su membrana celular. No causa efectos fitotóxicos a las dosis recomendados.

## COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

### Ingrediente Activo:

Gluconato de cobre .....**26%**  
Aporta 14% PV de Cu  
Acondicionadores y Diluyentes .....**74%**



**COFEPRIS**

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN  
CONTRA RIESGOS SANITARIOS



## DÓSIS Y MODO DE APLICACIÓN:

| CULTIVO  | ENFERMEDAD                         | DOSIS / HA                     | RECOMENDACIÓN  |
|--|------------------------------------|--------------------------------|--|
| Chile, tomate, papa, berenjena                     | Xanthomonas campestris Clavibacter | 1-2 L /Ha<br>Aplicación foliar | Realizar aplicación a intervalos de 15 días como preventivo. Realizar 3 aplicaciones a intervalos de 7 días como correctivo. |
| Frutillas (Zarzamora, fresa, frambuesa, mora azul) | Xanthomonas fragariae              | 1-2 L /Ha<br>Aplicación foliar | Realizar aplicación a intervalos de 15 días como preventivo. Realizar 3 aplicaciones a intervalos de 7 días como correctivo. |
| Melón, sandía, pepino, calabacita                  | Erwinia spp, Pseudomonas syringae, | 1-2 L /Ha<br>Aplicación foliar | Realizar aplicación a intervalos de 15 días como preventivo. Realizar 3 aplicaciones a intervalos de 7 días como correctivo. |

( ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la aplicación y cosecha. **SL**: Sin límite



## BENEFICIOS

\* FÁCIL ASIMILACIÓN POR LA PLANTA.

\* AMIGABLE CON EL CULTIVO Y CON LA FAUNA BENÉFICA.



Periodo de reentrada al área tratada: 0 horas.



## MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Agite vigorosamente, abra el envase, retire el sello de seguridad, mida la cantidad de **ZEN-CU** con la ayuda de una probeta o algún utensilio específico para este uso. Mezcle en un recipiente la cantidad de producto a utilizar con agua, agite, posterior agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersion. Su aplicación es vía foliar con mochila de aspersion, fumigadora motorizada y/o nebulizadora.



## TOXICOLOGÍA:

Categoría tóxica: **5. Precaución/Verde.**



## CONTRAINDICACIONES:

No aplicar en horas de calor intenso, cuando exista una probabilidad alta de lluvia o cuando la velocidad del viento sea alta.

**FITOTOXICIDAD:** No es Fitotóxico a las dosis y cultivo aquí recomendado y usado bajo las recomendaciones de esta etiqueta.

**INCOMPATIBILIDAD:** Compatible con bactericidas orgánicos, reguladores de crecimiento y acondicionadores. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba antes de hacer la mezcla final.

**CADUCIDAD:** Dos años a partir de la fecha de fabricación.

