

ZEN-CHRYST

Insecticida Orgánico

PIRETRINA

DESCRIPCIÓN:

Insecticida y acaricida orgánico hecho a base de extractos y piretrinas naturales, actúa por contacto e ingestión.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

Piretrinas naturales2.5%

Acondicionadores y Diluyentes97.5%



 DÓSIS Y MODO DE APLICACIÓN:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS / HA	RECOMENDACIÓN
Calabacita (SL), Calabaza (SL) Chayote (SL), Melón (SL) Pepino (SL), Sandía (SL)	Araña roja (Tetrany- chus urticae)	3-4 L/Ha	Realizar 3 aplicaciones foliares con un intervalo de 7 días cuando se presenten los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 350 L agua/ha.
Arándano (SL), Fresa (SL) Frambuesa (SL), Grosella (SL), Kiwi (SL), Vid (SL), Zarzamora (SL)		1-1.5 L/Ha	Realizar 3 aplicaciones foliares con un intervalo de 7 días cuando se presenten los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 700 L agua/ha.
Berenjena (SL), Chile (SL), Jitomate (SL), Okra (SL), Papa (SL),Pimiento morrón (SL), Tomate verde.	Mosca blanca (Bemisia tabaci)	1-2 L/Ha	Realizar 3 aplicaciones foliares con un intervalo de 7 días cuando se presenten los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 600 L agua/ha.

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la aplicación y cosecha. **SL**: Sin límite

 BENEFICIOS

- * ACTÚA POR CONTACTO.
- * NO GENERA RESISTENCIA.
- * REMUEVE RESIDUOS DE PESTICIDAS QUÍMICOS DE LAS HOJAS Y FRUTOS.



Periodo de reentrada al área tratada: 12 horas.



MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Agite vigorosamente, abra el envase, retire el sello de seguridad, mida la cantidad de **ZEN-CHRYST** con la ayuda de una probeta o algún utensilio específico para este uso. Mezcle en un recipiente la cantidad de producto a utilizar con agua, agite, posterior agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión. Su aplicación es vía foliar con mochila de aspersión, fumigadora motorizada y/o nebulizadora.



TOXICOLOGÍA:

Categoría tóxica: **5. Precaución/Verde.**



CONTRAINDICACIONES:

No aplicar en horas de calor intenso, cuando exista una probabilidad alta de lluvia o cuando la velocidad del viento sea alta.

FITOTOXICIDAD:

No es Fitotóxico a las dosis y cultivo aquí recomendado y usado bajo las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD:

Compatible con bactericidas orgánicos, reguladores de crecimiento y acondicionadores. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba antes de hacer la mezcla final.

CADUCIDAD:

Dos años a partir de la fecha de fabricación.

