



ZEN-CU

Bactericida

GLUCONATO DE COBRE 26%


DESCRIPCIÓN:

Bactericida agrícola de contacto, elaborado con gluconato de cobre. Preventivo y curativo contra enfermedades ocasionadas por bacterias fitopatógenas. Actúa contra las bacterias rompiendo su membrana celular. No causa efectos fitotóxicos a las dosis recomendados.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente Activo:

Gluconato de cobre**26%**
Aporta 14% PV de Cu
Acondicionadores y Diluyentes**74%**



COFEPRIS

COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS



DÓSIS Y MODO DE APLICACIÓN:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS / HA	RECOMENDACIÓN
Calabacita, Calabaza, Chayote, Melón, Pepino, Sandía (SL)	Mancha Angular (<i>Pseudomonas syringae</i>)	1-2 L /Ha Aplicación foliar	Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 300 L de agua/ha.
Berenjena, Chile, Jitomate, Tomate Verde, Okra, Papa, Pimiento Morrón (SL)	Mancha Bacteriana (<i>Xanthomonas campestris pv. vesicatoria</i>)	1-2 L /Ha Aplicación foliar	Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 300 L de agua/ha.
Zarzamora, Frambuesa, Fresa (SL)	Mancha Angular (<i>Xanthomonas fragariae</i>)	1-2 L /Ha Aplicación foliar	Realizar tres aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad y la incidencia y severidad sea menor al 5%; volumen de aplicación sugerido 700 L de agua/ha.

() **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la aplicación y cosecha. **SL:** Sin límite



BENEFICIOS

* FÁCIL ASIMILACIÓN POR LA PLANTA.

* AMIGABLE CON EL CULTIVO Y CON LA FAUNA BENÉFICA.



Periodo de reentrada al área tratada: 0 horas.



MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Agite vigorosamente, abra el envase, retire el sello de seguridad, mida la cantidad de **ZEN-CU** con la ayuda de una probeta o algún utensilio específico para este uso. Mezcle en un recipiente la cantidad de producto a utilizar con agua, agite, posterior agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión. Su aplicación es vía foliar con mochila de aspersión, fumigadora motorizada y/o nebulizadora.



TOXICOLOGÍA:

Categoría tóxica: **5. Precaución/Verde.**



CONTRAINDICACIONES: No aplicar en horas de calor intenso, cuando exista una probabilidad alta de lluvia o cuando la velocidad del viento sea alta.

FITOTOXICIDAD: No es Fitotóxico a las dosis y cultivo aquí recomendado y usado bajo las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: Compatible con bactericidas orgánicos, reguladores de crecimiento y acondicionadores. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba antes de hacer la mezcla final.

CADUCIDAD: Dos años a partir de la fecha de fabricación.

